



Racumin | Schaum | Stark | 500ml

Preis **74.80 Euro**

Lieferdauer **48 godzin**

Produktbeschreibung

- **Gift der zweiten Generation, das 0,4 % KUMATETRALYL (4 g/kg) enthält - eine Verbindung aus der Gruppe der synthetischen Antikoagulanzen mit ernährungsphysiologischer Wirkung**
- **Gift in Form von Schaum mit einem giftigen Rodentizid**
- **Das Rodentizid Racoumin enthält Bitrex - einen Bitterstoff, der eine versehentliche Einnahme durch Menschen und Haustiere verhindert.**
- **Rodentizid für den professionellen Gebrauch.**

Innovatives Rattengift für den Einsatz dort, wo andere Methoden versagen, oder als unterstützendes Gift. Der Schaum sollte auf Risse, Höhlen und unterirdische Tunnel aufgetragen werden – Stellen, die als Durchgänge und Nagetierhöhlen identifiziert wurden. Nagetiere verschmutzen beim Herumtollen ihr Fell mit Racumin-Schaum. Eine Vergiftung erfolgt oral, indem das Gift beim Reinigen des Fells abgeleckt wird. Racumin Foam-Gift ist äußerst wirksam, da Nagetiere nichts ahnen! Starke Wirkung von Comatetralyl – bereits eine einmalige Fütterung des Rodentizids führt bei Nagetieren zu Blutgerinnungsstörungen und Blutungen. Das Rodentizid Racumin kann Nagetiere in etwa zwei Wochen bekämpfen (je nach Schwere des Problems).

Schnell im Einsatz

Ein einmaliges „Füttern“ der Maus genügt, damit das Rattengift seine Wirkung entfaltet. Der Hersteller empfiehlt, den mit Gift bedeckten Bereich alle 2-3 Tage zu überprüfen, um tote Nagetierkörper zu entfernen.

Einsatzort

Produkt für den Innenbereich, Höhlen und unterirdische Tunnel. Stellen Sie vor der Verwendung des Schaums sicher, dass die Dose Zimmertemperatur hat. Kräftig schütteln, bis die Rührkugel deutlich hörbar ist. Das Produkt sollte mit der beigelegten Tube direkt in die Löcher und Lücken aufgetragen werden. Der Schaum bleibt viele Tage nach der Anwendung unverändert. Halten Sie die Dose beim Auftragen des Schaums senkrecht. Die Düse und das Rohr können in Wasser gewaschen werden. Eventuelle Schaumreste mit einem trockenen Papiertuch abwischen. Eine erneute Anwendung sollte nach 14 Tagen erfolgen.

Rattenbekämpfung: 20–30 g Köder pro Loch/Schlitz

Mäusebekämpfung: 4–30 g Köder pro Loch/Schlitz